

ETAT DES LIEUX: données du laboratoire

13,3% des cultures positives sont polymicrobiens, 1/3 de repiquage pour contrôle de pureté

Audit de réalisation des ECBU


METHODE

Autoquestionnaire réalisé à partir de référentiels validés, remplis par toutes les IDE de l'établissement (n = 20)


RÉSULTATS

Q.2 Prescription de l'ECBU


2.1 Disposez-vous d'une prescription lorsque vous réalisez un ECBU?



2.2 Disposez-vous d'une ordonnance signée par le Médecin pour le laboratoire?




2.3 Réalisez-vous une BU et/ou un ECBU, même en l'absence de prescription, lorsque vous constatez des urines nauséabondes ou troubles?




Q.3. Réalisation de la BU


3.1 Réalisez-vous une BU avant tout ECBU?



3.2 Trouvez-vous utile la réalisation de la BU avant tout ECBU?



3.3 Trempez-vous la bandelette dans le flacon ECBU?



- **Tout ECBU doit être prescrit**
- **Pas d'indication de réaliser une BU et/ou un ECBU en cas d'urines malodorantes ou troubles**
- **Connaître les indications et les limites de la BU**

Q.4. ECBU chez le patient autonome


4.1 Lui expliquez-vous la procédure de la toilette urinaire?




4.2 Quel produit utilisez-vous?



4.4 Souhaitez-vous une plaquette explicative pour la réalisation de l'ECBU?




4.3 Hygiène des mains après la toilette périnéale?




- **Expliquer** aux patients les points clés:
- **Toilette périnéale**
- **Urines du 2^{ème} jet**
- **Hygiène des mains ++++**

Q.5. ECBU chez le patient incontinent ou non autonome à l'aide d'un étui pénien

5.1 Utilisez-vous un sac à urine stérile?




Changez-vous le sac collecteur d'urine tant qu'il n'y a pas d'urine?




- **Nécessité d'utiliser un sac collecteur d'urine STERILE**
- **Changer le sac collecteur toutes les 1/2H**

Q.6. ECBU par sondage intermittent

Hygiène des mains Avant la toilette génitale?




6.5 Utilisez-vous un champs stérile percé?




- **Hygiène des mains++**
- **Utilisation d'un champ stérile**

Q.7. ECBU sur sonde à demeure


7.1 Hygiène des mains



7.2 Utilisation de gants non stériles




7.3 Désinfection du site de prélèvements




Q.8. Transport au laboratoire


8.1 Notez-vous l'heure du prélèvement?



8.4 DANS VOTRE EXPERIENCE, EN COMBIE DE TEMPS EST PRIS EN CHARGE LE PRÉLÈVEMENT AU LABORATOIRE?



8.5 TROUVEZ-VOUS LA PROCÉDURE AVEC LE LABORATOIRE SUFFISAMMENT CLAIRE?



- **Clarifier les procédures avec le laboratoire++++**
- **ORGANISATION+++**

❖ **Conclusion:** Procéder en toute circonstance au recueil aseptique des urines et garantir leur acheminement correct au laboratoire est un élément essentiel à la prise en charge du patient infecté ou suspect de l'être. L'audit a permis l'élaboration d'un protocole institutionnel, en utilisant une méthode de travail permettant des interactions transdisciplinaires